

XIV

PLANTES A RAYER DE LA FLORE VALAISANNE

par M. JACCARD.

A. Plantes cultivées, quelquefois échappées des jardins.

Clematis integrifolia, *C. Flammula*, *C. Viticella*; *Anemone hortensis*, *Helleborus niger*, *Nigella damascena*; — *Dianthus barbatus*, *D. caryophyllus*; — *Althæa rosea*, *Lavatera trimes-tris*, *Hibiscus trionum*, *Abutilon Avicennæ*; — *Tropæolum majus*, *Zyzyphus vulgaris*, *Spartium junceum*, *Genista pilosa*, du Jura, « cultivé dans le jardin de Thomas et dans le mien. » (Murith); *Lupinus albus*, *L. luteus*; *Trigonella Fœnum græcum*; *Melilotus cœrulea*; *Galega officinalis*, *Tetragonolobus purpu-reus*; — *Rosa gallica*; *R. centifolia*; — *Pimpinella Anisum*, *Sium Sisarum*, *Archangelica officinalis*; — *Pinardia corona-ria*, *Carthamus tinctorius*, *Oniscus benedictus*, *Xeranthemum cy-lindraceum*, *X. annuum*; — *Ocimum Basilicum*, *Lavendula vera*; — *Phytolacca decandra* — *Scilla amœna*, *Sc. italica*; — *Phalaris paradoxa*.

B. Plantes habitant les contrées voisines.

Helleborus viridis, Vaud et Savoie.
Arabis stricta, du Salève.
Dianthus Seguieri, Italie et Tessin.
Alsine Villarsii, vallée d'Aoste.
Tribulus terrestris, id.
Sorbus torminalis, à Roche, Aigle (Vaud).
Montia fontana, vallée d'Aoste.
Saxifraga mutata, Suisse centrale et N.
Petroselinum segetum, « jardin de Thomas » (Murith).
Sison Amomum, canton de Genève, « cultivé par Thomas » (id.).

Ligusticum Seguieri, Tessin.

Peucedanum verticillare, Grisons.

Asperula taurina, Suisse orientale et Tessin.

Galium saccharatum, Vaud.

Inula Vaillantii, Vaud.

» *hirta*, Tessin, vallée d'Aoste, « jardin de Thomas » (Murith).

Santolina Chamæcyparissus, vallée d'Aoste. Autrefois cult. aux Gex sur Fully; disparu.

Senecio aurantiacus, Château-d'Œx.

Leucanthemum corymbosum, « forêts d'Aigle » (Mth.), où il n'est certainement pas !

Tragopogon crocifolius, vallée d'Aoste.

Scorzonera humilis, Tessin, Jura.

Crepis pulchra, vallée d'Aoste (« une fois à Sion, » Wolf).

Campanula Cervicaria, Bex (Vaud).

Anarrhinum bellidifolium, Genève.

Pedicularis versicolor, Pays-d'Enhaut.

Orobanche Rapum, Tessin.

Teucrium lucidum, St-Bernard sec. All.; déjà douteux pour Mth., p. 100.

Anagallis tenella, Vaud, district de Vevey.

Primula pedemontana et *P. latifolia*, Italie.

Samolus Valerandi, Vaud, district d'Aigle.

Kochia prostrata, vallée d'Aoste.

Rumex nivalis, Alpes de l'Oberland.

Thesium restratum, Suisse orientale.

Euphorbia palustris, Vaud.

Parietaria diffusa, *Quercus Cerris*, canton du Tessin.

Scheuchzeria palustris, Alpes vaudoises.

Gagea minima, id.

Juncus supinus, Vaud, rives du Léman.

Scirpus supinus, *nucronatus*, *Holoschæmus*, id.

Carex brizoides, *elongata*, *filiformis*, Vaud.

Andropogon Gryllus, Bex.

Arundo Donax, cultivé par Thomas.

Melica uniflora, bois du bassin du Léman.

Danthonia decumbens, Vaud.

Gaudinia fragilis, Vaud (en Valais, sec. Gremli, sine loc.)

C. Plantes dont on donne des stations valaisannes, par confusion avec d'autres espèces, ou qui ont disparu.

Thalictrum alpinum L. Rion p. 2, Murith p. 100 : pris pour lui le *Th. fœtidum*, v. *glabrum*.

Thalictrum simplex L. R. p. 3, Mth. p. 100 : *Th. Bauhini* Crtz. et sa variété *alpicolum* qu'on trouve en effet dans les stations indiquées.

Nymphæa candida, herbier de R., de provenance inconnue.

Arabis sagittata, grandes formes de l'*A. hirsuta*.

» *stricta*, forme de l'*Arabis muralis*.

» *verna*, » » » »

Erysimum canescens, R. 23, formes incanes de l'*helveticum*.

» *Cheiranthus*, inconnu en Valais.

Sinapis Cheiranthus, R. p. 24, cite Mth., qui n'en parle pas.

Alyssum campestre, Mth. p. 50, R. p. 25, inconnu.

» *minimum*, R. p. 25, inconnu.

Iberis amara, R. p. 29, dit « cultivé dans les jardins, » par confusion avec *I. umbellata*.

Lepidium subulatum, étranger à la Suisse.

Viola lutea, R. p. 35 = *V. calcarata* fl. flavo (*V. Zoysii* Wulf).

Sagina apetala, R. p. 41 = *S. procumbens*; les stations de Ritz s'y rapportent certainement.

Cerastium campanulatum, étranger à la Suisse.

Geranium pratense L., « prés humides, » Mth. p. 70, indiqué aussi par Favre autour du Simplon, = formes du *G. sylvaticum*.

Genista ovata, R. p. 54, plante du S. des Alpes. Mth. a sans doute pris pour lui la forme à fr. velus du *G. tinctoria* (v. *lasiocarpa*), que Sandoz a trouvée dans le voisinage (Salvan).

Trifolium noricum, indiqué au Simplon par Venetz = *Trif. pratense*, v. *nivale* Sieb, que Mth. était disposé aussi à prendre pour le *T. noricum* (Mth. p. 102).

Trif. resupinatum, Mth. p. 102, inconnu en Valais.

Vicia villosa, en Valais d'après K.; inconnu.

Lathyrus angulatus = *L. sphaericus*.

» *Aphaca*, indiqué par Roth au Ganterthal et dans Conches; jamais revu par personne.

» *hirsutus*, jamais signalé depuis Mth.

Sedum purpurascens, formes un peu lavées de rose du
S. maximum.

» *anopetalum* DC., formes du *S. rupestre* L.

Helosciadium nodiflorum et *H. inundatum*, jamais vus depuis
Haller, qui les a signalés dans la partie *vaudoise* de la val-
lée du Rhône.

Bupleurum graminifolium, formes du *B. stellatum* (*B. pe-
træum*, Gr. et God. non Richb.).

Œnanthe fistulosa, confondue par Mth. avec *Œ. Lachenalii*.

» *Phellandrium*, inconnu en Valais.

Laserpitium gallicum L., étranger à la Suisse.

» *trilobum*, Suisse or. et Tessin, indiqués les deux
par Mth. à la Rosseline, où on les chercherait
en vain.

Asperula tinctoria, confondue par Mth. avec *Asp. montana*,
qu'il ignorait.

Knautia longifolia, du Jura; indiquée par Gaud. sur Port-
Valais: sans doute une forme de *K. silvatica*.

K. arvensis c. *Halleri*, Mth. in Rion p. 106, ne doit pas être
une var. du *K. arvensis*. Si l'on consulte Mth. p. 94, on voit
que sous n° 207 il en fait une espèce, *Halleri* N. (*nobis*).
D'après la station, Ravoire-Bâtiaz, ce doit être le *Sc. agres-
tis* WK. qu'il ne mentionne pas.

Filago minima, au mont Fully d'après Mth., station invrai-
semblable.

Cineraria campestris, R. p. 118, inconnu en Valais.

Inula Helenium, cantine du St-Bernard (Métroz), autrefois
cultivé.

Cirsium Erisithales, R. p. 121, cité d'après Mth., qui appelle
ainsi le *C. erucagineum* (*C. oleraceo-rivulare*), voir Mth.
p. 62.

Carduus tenuiflorus, vallée de Conches, jamais vu depuis
Gaudin.

Leontoden incanus, formes hérissées du *L. proteiformis*.

Sonchus palustris, grandes formes du *S. arvensis*.

Crepis præmorsa, indiqué avec doute à La Muraz de Thyon.

Cette plante des coteaux de la Suisse N. n'y est certaine-
ment pas.

Hieracium andryaloides = formes du *H. lanatum*.

Campanula Pulla = f. uniflore du *C. barbata*.

» *Allionii* = f. uniflore du *C. barbata*.

C. sibirica, Mth. p. 57, inconnu.

Gentiana Amarella = formes du *G. campestris*.

Anchusa leptophylla, R. p. 149, *A. angustifolia*, Mth. p. 51 ; sans doute confondu par Mth. avec *A. officinalis* qu'il ne mentionne pas.

Orobanche Rapum, cité par R. sans localité.

Centunculus minimus, plante de la plaine vaudoise, que Mth. croit avoir trouvée sur le col de glacier entre Saas et Antrona.

Chenopodium urbicum auct. helv. non *L.* = *Ch. intermedium* *K.* Voir note page 50.

Atriplex latifolia, « commun, » Mth. p. 54, par confusion avec *A. patula*.

Betula nana et *B. intermedia*, des tourbières du Jura ; indiqués par je ne sais quelle confusion à Vercorin et Bagnes.

Potamogeton obtusifolius, indiqué à Brigerbad, pris pour lui des formes du *P. pusillus*. Ducommun, p. 705, indique à Brigue un *P. Berchtoldi* (que Grml. réunit au *P. pusillus*).

Orchis laxiflora, R. 197 = *O. palustris*.

Narcissus odoratus, R. p. 202 = *N. radiiflorus-pseudo Narcissus*.

Lilium bulbiferum = *L. croceum* Chaix.

Allium suaveolens, R. 206 = *A. strictum*, qu'on trouve dans ces stations.

Juncus capitatus, R. 210, Conches (Ph. Thomas), où personne ne l'a vu depuis.

Scirpus setaceus, indiqué par Mth. à Barberine, station impossible, et dans le marais de Roche et Vervev (Vaud).

Carex baldensis, indiqué par Lager dans l'Eginenthal : plante des environs de Côme.

Carex acuta, entre Saxon et Saillon. Je n'y ai vu que du *C. paludosa*.

Alopecurus pratensis, plante du Jura. Valais, Venetz.

Agrostis canina, « Vignes des Marques » Mth., station invraisemblable. Sans doute une forme d'*A. alba*.

Avena pratensis, n'a été vu par personne depuis Mth., qui le croit commun.

» *sesquiteria*, cité par Alioth au pied de la Gemmi. Serait-ce la même plante que R. indique à Louèche-Bains sous le nom de *Av. argentea* Vill. et que Du-

commun mentionne sous *Trisetum distichophyllum*
β argenteum avec le syn. *A. sesquiteria* W. ?

Bromus inermis, pas revu depuis Mth.

Adiantum Capillus Veneris, indiqué à Ravoire par Mth., peut-être par confusion avec *Asplenium Adiantum-nigrum*.

Gymnogramme Marantæ, indiqué au S. du Simplon (Davodro), où l'on trouve le *Woodsia hyperborea*.

